

Минздрав утвердил инструкции, определяющие порядок диспансеризации взрослого и детского населения

Инструкции утверждены ведомственными постановлениями от 16 декабря 2024 года №173 и №174 соответственно.

ВАЖНО:

- диспансеризация взрослых в возрасте: 18-39 лет проводится в течение одного рабочего дня – раз в три года,
- взрослых в возрасте: от 40 лет и за пять лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста – раз в год,
- в течение двух рабочих дней один раз в год проводится диспансеризация лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение пяти лет до достижения такого возраста.

Диспансеризация детей проводится в группах диспансерного наблюдения до 1 года и с 1 года до 17 лет. Установлены различные схемы ее проведения в зависимости от возраста, наличия группы риска развития заболеваний. Она проводится участковым врачом-педиатром или врачом общей практики, обслуживающим детское население в амбулаторно-поликлинических организациях по месту их фактического проживания.

Постановлением Минздрава от 16 декабря 2024 г. № 173 «О порядке проведения диспансеризации взрослого населения» утверждена Инструкция о порядке проведения диспансеризации взрослого населения и признано утратившим силу постановление ведомства от 30 августа 2023 г. № 125 «О порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения».

В новой редакции Инструкции о порядке проведения диспансеризации взрослого населения относительно старого документа, есть изменения:

исключены:

- перечень заболеваний (состояний), подлежащих медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях (взрослое население);
- перечень заболеваний (состояний), подлежащих медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях (детское население);
- анкета выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний и последующее определение лабораторных и диагностических исследований у взрослого населения.

Включена карта оценки симптомов и признаков предопухолевых и опухолевых заболеваний.

Уточнены формулировки отдельных пунктов Инструкции.

Расширены критерии эффективности диспансеризации взрослого населения.

В схему проведения диспансеризации взрослого населения **добавлены:**

- осмотр полости рта зубным фельдшером/врачом-специалистом стоматологического профиля или врачом-оториноларингологом;
- расширен перечень показателей биохимического анализа крови (креатинин, АЛТ, общий холестерин, триглицериды) и установлена периодичность исследования;
- установлена периодичность проведения общего анализа крови, общего анализа мочи, глюкозы крови, электрокардиографии;
- скорректирована периодичность проведения медицинского осмотра женщин в смотровом кабинете, забора биологического материала с шейки матки с целью ранней диагностики предопухолевых и опухолевых заболеваний, маммографии молочных желез;
- скорректирована периодичность проведения исследования для определения простатспецифического антигена для мужчин;
- уточнено определение наличия генотипов вируса папилломы человека при проведении ВПЧ-тестирования высокого канцерогенного риска (14 генотипов).

Постановления вступили в силу 1 января 2025 г.

Пресс-служба Министерства здравоохранения